


Orientações sobre Febre Amarela



**A vacinação é a
principal forma de
evitar a doença!**

CECOM – UNICAMP

Quais são os sintomas da doença?

Os sintomas iniciais incluem febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, fadiga, fraqueza, náuseas e vômitos.

Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

Não existem medicamentos específicos para combater a doença.

O site do CECOM disponibiliza as áreas de recomendação da vacina no Brasil.

Fonte: Ministério da Saúde

**Núcleo de Vigilância
Epidemiológica
CECOM / UNICAMP**

Equipe:

Edite Kazue Taninaga
Inajara de Cassia Guerreiro
Dr^a Maria Helena Pavan
Pedro Augusto Thiene Leme
Rosana Vasques Rosa

Coordenação:

Rose Clélia Grion Trevisane

www.cecom.unicamp.br



O que é a febre amarela?

É uma doença infecciosa febril aguda, causada por um arbovírus (vírus transmitido por artrópodes), que pode levar à morte.

Como ocorre a transmissão da doença?

Na Febre Amarela silvestre, os mosquitos dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes* transmitem o vírus e os macacos são os principais hospedeiros; nessa situação, os casos humanos ocorrem quando uma pessoa não vacinada adentra uma área silvestre e é picada por mosquito contaminado. Na Febre Amarela urbana o vírus é transmitido ao homem pelos mosquitos *Aedes aegypti*, mas esta não é registrada no Brasil desde 1942.



Quantas doses da vacina são indicadas?

Para adultos que nunca foram vacinados ou para o caso de não haver comprovante de vacinação, administrar a primeira dose da vacina e um reforço após dez anos.

Pessoas que receberam duas doses da vacina estão imunizadas e não precisam mais se vacinar.

Quem deve tomar a vacina?

As recomendações são apenas para as pessoas que vivem ou viajam para áreas endêmicas.

A vacina deve ser realizada pelo menos 10 dias antes da viagem.

A população que não vive na área de recomendação ou não vai se dirigir a essas áreas não precisa buscar a vacinação neste momento.

Quais são as contra-indicações?

- Crianças menores de 6 meses de idade;
- Pacientes com imunodepressão de qualquer natureza;
 - Pacientes com neoplasia
- Pacientes infectados pelo HIV e AIDS;
- Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores);
- Pacientes submetidos a transplante de órgãos.

OBS: Pessoas com 60 anos ou mais só poderão receber a vacina após avaliação do risco/benefício por profissional médico, apresentando prescrição médica com a indicação da vacina.

Fonte: Ministério da Saúde